

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
Cc: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl];
 (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Fri 10/16/2020 9:51:48 AM
Subject: FW: medisch mondneusmaskers in zorg buiten het ziekenhuis
Received: Fri 10/16/2020 9:51:49 AM

Ho (10)(2e)

Van (10)(2e) en (10)(2e) begrepen we dat er gewerkt wordt aan een nieuwe richtlijn 'Medisch mondneusmaskers in zorg buiten het ziekenhuis'.

I.v.m. (10)(2e) heb ik van (10)(2e) jouw naam doorgekregen.

(10)(2e) en ik zijn (10)(2e) voor de hiepriek en we willen je graag een aantal vragen voorleggen.

Tot nu toe hebben we onze informatie en adviezen altijd met (10)(2e) afgestemd. Zij heeft vaak (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) laten meekijken.

Alvast bedankt.

De vragen die wij nu hebben zijn gerelateerd aan de nieuwe Richtlijn 'Medisch mondneusmaskers in zorg buiten het ziekenhuis' die binnenkort uitkomt.

Tot nu toe hebben wij geen adviezen over mondkapjes gegeven, en hebben daarvoor verwezen naar de adviezen van de werkgever.

• *Ter info: Algemene informatie over de hiepriek*

De hiepriek wordt op dag 3-4 na de geboorte afgenomen. Tijdige afname van de hiepriek is van groot belang voor het de gezondheid van het kind.

Op de website <https://www.pns.nl/hiepriek/coronavirus> staat hierover: 'De hiepriek test op een aantal ernstige ziekten. Soms kan zo'n ziekte al heel vroeg schadelijk zijn voor het kind. Als de ziekte vroeg wordt ontdekt, kan het kind snel behandeld worden. Daarom is het belangrijk de hiepriek op tijd af te nemen. De hiepriek gebeurt zo snel mogelijk vanaf de derde of vierde dag na de geboorte. Het advies is om de hiepriek niet uit te stellen.'

Ter info: de praktijk

In het algemeen is de hiepriek, incl. de gehoorscreening een kortdurend contact van < 15 min < 1,5 meter. Een screener is natuurlijk wel langer > 1,5 m in het gezin.

De screener gaat dagelijks langs diverse adressen om de hiepriek/gehoorscreening af te nemen, en zit tussendoor in de auto of op de fiets.

• **Vraag:** Vallen screeners die thuis de hiepriek afnemen (al dan niet met gehoorscreening) onder deze Richtlijn?

De vraag betreft hiepriekafname/gehoorscreening in de situaties zoals beschreven onder scenario 1 en 2 (zie kader, hieronder), waarbij wij tot u toe geen mondkapje adviseren.

Bij scenario 3 en 4, waarbij sprake is van een verdenking op of een bevestigde corona-infectie wordt verwezen naar de werkgever. (overigens dragen veel screeners momenteel bij hun werk een niet-medisch mondkapje)

• **Vraag:** Valt 'langs diverse adressen' onder 'veelvuldig achter elkaar contact < 1, 5 meter of niet?

• **Vraag:** Van belang hierbij is of de tijdsduur van het contact met de baby alleen (bij de gehoorscreening ligt een kind vaak in bed/wieg/Maxi-Cosi) ook meetelt bij het < 1,5 m contact.

• **Vraag:** Valt een screener onder 'bezoek'?

Of vallen gezondheidsgerelateerde huisbezoeken van huisarts/jgz/kraamzorg niet onder bezoek?

(i.v.m. maatregel: Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag)

• In de informatie op de NCJ-website over de hiepriek (<https://www.ncj.nl/themadossiers/coronavirus/onderwerpen-a-z/>) staat: 'Indien in het huis één of meer huisgenoten of andere personen zijn met verkoudheidsklachten, vraag dan of er al getest is, zo ja, wat de uitslag was. Zo niet, dan is het advies om dit als eerste te doen, en even de uitslag af te wachten indien het tijdspad dat nog mogelijk maakt. Zo niet, vraag dan of een ander gezond persoon (buiten het gezin) aanwezig kan zijn en/of met het kindje naar de jgz locatie kan komen.'

Wij begrijpen niet goed waarom in deze tekst bij verkoudheidsklachten eerst een test wordt afgewacht.

De uitslag van een corona-test kan wel een aantal dagen op zich laten wachten. Dat geeft ongewenste vertraging bij de hiepriek.

Veel liever houden wij ons aan de adviezen die we hebben beschreven in onderstaand kader.

Vraag: Wat vind jij van de bovenstaande tekst op de NCJ-website?

Ter info: In onze informatie aan screeners maken we een indeling in 4 scenario's (i.o.m. (10)(2e)

<https://www.pns.nl/hielprik/professionals/corona>

De volgende scenario's zijn denkbaar:

1. In het huis zijn geen personen met gezondheidsklachten of personen die in quarantaine zijn: er gelden geen extra aandachtspunten.
2. In het huis zijn personen met alleen milde klachten, zonder koorts en/of benauwdheid: de hielprik kan thuis plaatsvinden met inachtneming van de extra aandachtspunten, zoals hieronder beschreven.
3. In het huis is een persoon met klachten, MET koorts (>38 graden) en/of benauwdheid, of in het huis is iemand in quarantaine:
overleg met de werkgever of de hielprik thuis kan worden afgenomen met inachtneming van de extra aandachtspunten, zoals hieronder beschreven, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.
Desgewenst kan de werkgever hierover contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.
4. In het huis is een patiënt met een bevestigde corona-infectie:
overleg met de werkgever op welke manier en met welke aanvullende maatregelen de hielprik afgenomen kan worden.
Desgewenst kan de werkgever hierover contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Mobiel: (10)(2e)

E-mail: (10)(2e) @rivm.nl

(10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM- Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's Noord-Oost (DVP- NO)

Lübeckplein 34 | 8017 JS Zwolle

Postbus 7020 | 8007 HA Zwolle

T (10)(2e)

RIVM- Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 (interne postbak 13) | 3720 BA Bilthoven

T (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 12:37

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

CC: (10)(2e) 0(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: medisch mondneusmaskers in zorg buiten het ziekenhuis

Beste (10)(2e)

Er komt deze week een nieuw advies om medische mondneusmaskers te gebruiken in de zorg buiten het ziekenhuis waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Dit wordt nog aangepast op de LCI website.

De essentie hiervan zal zijn:

Gebruik een chirurgisch mondneusmasker (type IIR):

- Als er contact is <1,5 meter gedurende meer dan 15 minuten
- Als de verwachting is dat er meerdere direct op elkaar volgende contacten zijn, waarbij de medewerker geen 1,5 meter afstand kan houden (zoals bij een groeps vaccinatie)

Voor de hiepruk verandert er niks, omdat hier niet >15 minuten <1,5 meter gewerkt wordt lijkt me. Of zien jullie dit anders?

Voor het RVP heb ik dit doorgegeven aan (10)(2e) en de AJN.

Groet (10)(2e)