

To: (10)(2e) [(10)(2e) @minvws.nl]
Cc: Groep PG medewerkers [(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e)
(10)(2e) [(10)(2e) @minvws.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Mon 10/12/2020 7:18:34 AM
Subject: RE: Corona en BMR-vaccinatie
Received: Mon 10/12/2020 7:18:35 AM

Ha (10)(2e)

Dank voor je bericht! Er zijn inderdaad signalen dat levend verzwakte vaccins kunnen bijdragen aan een milder verloop van een coronavirus infectie. Dit wordt echter nog uitgebreid onderzocht. In dat kader ondersteunen we vanuit VWS een grote studie onder kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers, die worden gevaccineerd met het BCG-vaccin (ook een levend verzwakt vaccin, dat wordt ingezet tegen tuberculose).

We hebben in het voorjaar ook gesproken met het RIVM en de onderzoekers van de BCG-studie over BMR-vaccinatie. Ik meen me te herinneren dat hier minder van werd verwacht dan de BCG-vaccinatie. Of er is gekeken naar het aantal patiënten met COVID-19 die een BMR-vaccinatie hebben gehad weet ik niet, maar ik zal het voor je navragen.

Groet!

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel