

BAO 30 maart

Algemeen

Groei ziekenhuisopnames daalt, dat zou kunnen betekenen dat de epidemie onder controle zou kunnen zijn.

De maatregelen hebben een reductie van transmissie van 60% bewerkstelligd.

Piek IC opnames wordt medio april verwacht. We weten niet of we voldoende bedden hebben.

Advies 1

Het is te vroeg om te stoppen met de maatregelen, deze moeten worden verlengd worden tot eind april/ begin mei.

Geen reden om aanvullende maatregelen te nemen. Met uitzondering van reisadviezen voor de Paas en Meivakantie, mensen moeten thuis blijven.

Er moet een exit-strategie worden besproken. Er wordt gerekend wat het effect is van de verschillende maatregelen om te bepalen welke maatregelen op welk moment afgeschaald kunnen worden.

Advies 2

Alle plekken waar onvoldoende afstand gehouden kan houden moeten gesloten blijven. Er moet dus ook niet in eigen land met vakantie worden gegaan. Mensen moeten thuis blijven en niet naar vakantieparken gaan. Er moeten geen verplaatsingen op gang komen waar mensen met elkaar in contact komen.

Q: Er zitten mensen in vakantieparken die geen vaste woon- en verblijfplaats hebben. Wat ga je met die mensen doen. A: deze mensen wonen daar en moeten daar dus blijven.

Advies 3

(???? verbinding viel weg) Als we op 5 april op een prognose van meer dan 2400 bedden wordt de situatie nijpend.

Testen

Sneltesten: zijn niet inzetbaar in acute fase van testen en zijn niet 100% betrouwbaar.

Er moet een nadere uitwerking van soorten testen komen.

Capaciteit van de testen zijn nu 4.000 dit kan worden opgeschaald naar 21.0000 daarvoor is ca 1 week nodig.

Er komt een verruiming van het testbeleid als de testcapaciteit is verruimd, in ziekenhuizen blijft het testen onveranderd en kritische zorgmedewerkers moeten als eerste worden getest.

In de eerste lijn moet het testen worden verruimt, bv mensen met grote zorgbehoefte.

Ook medewerkers met klachten in de eerste lijn moeten getest worden.

Verpleeghuizen: verruiming naar medewerkers met klachten.

Gehandicaptenzorg, gelijk stellen met verpleeghuizen. Het gaat dan om mensen die in instellingen verblijven (WLZ indicatie).

GGDen kunnen testen bij contacten met patiënten met verhoogd risico

Thuiszorg op indicatie van de huisarts. Alleen mensen met klachten die behoren tot de risicogroep. Thuiszorgmedewerkers met klachten kunnen ook worden getest.

Geinstitutionaliseerde zorg wordt geadviseerd om patiënten en medewerkers te testen.

GGZ: geïnstitutionaliseerde zorginstelling: medewerkers die werken met patiënten met COVID worden getest.

Testbeleid van ambulante zorgverlening blijft gelijk (dus criteria die nu horen bij testen door huisarts).

Mondmaskers

Gezien de tekorten moet er zuinig gebruik worden gemaakt. Er is een afwegingskader gemaakt binnen de zorg. Alleen gebruik van maskers bij patiënten die klachten hebben die passen bij Corona, daar waar de patiënten zich bevinden in de zorg. Gebruik ter bescherming van de medewerkers of ter bescherming van de patiënt (bv chemo therapie patiënten).

Hergebruik: er worden verschillende sterilisatiemethoden (waterstofperoxide, gammastraling) toegepast voor FFP maskers (niet van chirurgische mondmaskers) met verschillende resultaten en betrouwbaarheid. Dit moet beter gecoördineerd worden. Mensen met kennis van zaken moeten betrokken worden om te onderzoeken welke methodes werken en welke niet.