



iPrevent REZON

Beleid COVID-19 (versie 26-2-2020)

De kans op verspreiding van het Corona-virus (SARS-CoV2) verder binnen Europa is door de gebeurtenissen in de afgelopen dagen toegenomen. De **Casus-definitie** is gisteren landelijk aangepast, maar zal vermoedelijk in de volgende weken frequent moeten worden aangepast.

Casusdefinitie verdenking

- **Koorts*** (ten minste 38 graden Celsius) én **ten minste één** van de volgende respiratoire verschijnselen: **hoesten, kortademigheid**
 - *Of koortsig gevoel bij ouderen (>65), aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen.*
 - *Of een ernstig immuun gecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook.*
 - *Zoals:*
ernstige primaire immuundeficiëntie, chemotherapie/radiotherapie afgelopen 6 mnd, solide orgaan transplantatie met immunosuppressieve therapie, stamcel transplantatie met immunosuppressieve therapie, patiënten met GvHD, hoge dosis corticosteroiden (40 mg prednisolon per dag gedurende >1 week – tot 3 maanden na stop therapie, HIV met CD4 getal <200

EN

- de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met (wijdverspreide of lokale) transmissie:
 - Landen/regio's met wijdverspreide transmissie zijn: China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan), Singapore, Iran, Zuid-Korea en Noord-Italië
 - Landen/regio's met lokale transmissie zijn: Japan, Maleisië, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam

of:

- de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2

Patiënt voldoet aan casus-definitie

Bij verdenking (meldingsplichtige ziekte groep A) belt de specialist ouderengeneeskunde altijd direct de arts Infectieziektenbestrijding van de GGD. Deze is 24/7 hiervoor beschikbaar. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct de verdenking anoniem en conform de Wet publieke Gezondheid aan het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM.

Contactgegevens GGD



iPrevent REZON

Indien de patiënt niet in het ziekenhuis wordt opgenomen:

- **Maatregelen thuis:** patiënt gaat thuis in quarantaine. Volg aanwijzingen GGD.
 - **Maatregelen in verpleeghuis, woonzorgcentrum of voorziening voor kleinschalig wonen:**
 - Verplaats de patiënt naar een 1-persoonskamer met eigen sanitair indien de patiënt dit nog niet heeft
 - Beschermende maatregelen medewerker:
 - Druppel contactplus maatregelen: schort met lange mouwen voorzien van PE-coating*, masker FFP2/FFP1**, beschermende bril en handschoenen
- * Schort met lange mouwen moet voorzien zijn van PE-coating:
- **Draag bij hoog-risico handelingen altijd een schort met lange mouwen voorzien van PE-coating.** Voorbeelden van hoog-risico handelingen zijn: uitzuigen/bronchiaal toilet, handelingen rondom een maagsonde, afnemen van een diepe keelweek of een nasopharynx uitstrijk, afnemen van geforceerd sputum, intubatie, hulp bij (elektrisch) tandenpoetsen.
 - Indien er onvoldoende schorten met lange mouwen voorzien van PE-coating aanwezig zijn, draag bij alle andere handelingen/zorgmomenten (niet hoog-risico) een halterschort die voorzien is van een PE-coating.
- **FFP2/FFP1 masker:
- **Draag bij hoog-risico handelingen altijd een FFP2 masker.** Voorbeelden van hoog-risico handelingen zijn: uitzuigen/bronchiaal toilet, handelingen rondom een maagsonde, afnemen van een diepe keelweek of een nasopharynx uitstrijk, afnemen van geforceerd sputum, intubatie, hulp bij (elektrisch) tandenpoetsen.
 - Indien er onvoldoende FFP2 maskers aanwezig zijn, draag dan bij alle andere handelingen/zorgmomenten (niet hoog-risico) een FFP1 masker

Basismaatregelen bij alle cliënten

- Hang de “Basishygiëne voor medewerkers: tien belangrijkste regels” op teamkamers, koffiekamers e.d. Spreek elkaar hierop aan!
- Draag een mond-neusmasker/FFP1 masker en een beschermende bril bij hoog-risico handelingen op “aanhoesten” zoals:
 - uitzuigen/bronchiaal toilet
 - handelingen rondom een maagsonde
 - afnemen van een diepe keelweek of een nasopharynx uitstrijk
 - afnemen van geforceerd sputum
 - intubatie
 - hulp bij (elektrisch) tandenpoetsen

Het bovengenoemde is nogmaals expliciet beschreven omdat het standaard [protocol persoonlijke beschermingsmiddelen](#) waarin staat dat men een beschermende bril en een (chirurgisch) mond-neus-masker moet dragen bij kans op spatten niet altijd wordt gevolgd.
- Stimuleer cliënten om regelmatig de handen te desinfecteren of te wassen, in ieder geval voor de maaltijd en na toiletgang. Bied zonodig hulp aan. Zet, mits verantwoord een flacon handdesinfectans met pompje op de tafel in de huiskamer



iPrevent REZON

Maatregelen voor bezoekers

- Zet bij de ingang van een locatie een tafel met hierop een flacon handdesinfectans met pompje of een standaard (paal) waaraan een dispenser met handalcohol hangt.
- Leg op een tafeltje bij de ingang tissues neer
- Leg of hang hierbij de bekende oranje 'Hygiënekaart voor bezoekers'
- Leg of hang hierbij de nieuwe kaart 'Hoest en nieshygiëne'
- Mocht uw locatie de beschikking hebben over een scherm in een algemene ruimte: plaats de dia 'Hoest en nieshygiëne' op het scherm