

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Tue 9/22/2020 7:27:56 AM  
**Subject:** Doorst: Kind met koorts  
**Received:** Tue 9/22/2020 7:27:56 AM

Mooi voorwerk alvast van [5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.5] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Datum:** 21 september 2020 om 15:38:34 CEST  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Kind met koorts

Dag [5.1.2e]

Sorry voor de late reactie, ik kon aanhaken bij een aantal overleggen, dus ik was vertraagd in het uitzoeken. Als ik het goed begreep, was jouw vraag in hoeverre in richtlijnen van de 1<sup>e</sup> lijn (impliciet) staat beschreven wat de apriorikans is van corona bij kinderen met koorts. Ik heb de website van Thuisarts en NHG bekeken:

Op Thuisarts (<https://www.thuisarts.nl/koorts-bij-kinderen>) staat beschreven dat kinderen met koorts soms sprake is van corona. Er wordt vooral aangestuurd op direct contact opnemen met de huisarts bij een kind met koorts met bijzonderheden (bijv. < 3 mnd oud, comorbiditeit, onvolledig RVP).

In andere gevallen stimuleren ze het kind goed te observeren en bij alarmsymptomen die kunnen duiden op ernstige ziekte contact op te nemen.

Ook voor kinderen verwijzen ze naar de corona informatiepagina die ook voor volwassenen is (<https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-mogelijk-corona>), daarin wordt geen onderscheid gemaakt obv leeftijd.

- Hieruit maak ik op dat ze wel duidelijk kijken naar risicogroepen voor infectie en een triage doen op urgentie, maar waarbij ze er niet zozeer vanuit gaan dat het corona is tot het tegendeel bewezen is. Er wordt slechts zijdelings benoemd dat het ook corona kan zijn.

Op NHG (<https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/kinderen-met-koorts>) wordt er niet gesproken over corona. Hier wordt ook naar urgentie gehandeld en volgt een diagnostische workup indien nodig. Focus van de koorts is o.a. bepalend voor het beleid (sluit aan bij wat [5.1.2e] zei: indien koorts duidelijk een focus is van een andere diagnose dan corona, geldt het thuisblijven niet). Ook lees ik dat onder kinderen wordt verstaan als iemand <18 jaar is, maar dat de richtlijn grotendeels is gericht op jonge kinderen tot 5 jaar, omdat bij hen koorts het meest voorkomt (kan nog bruikbaar zijn voor afkapwaarde qua leeftijd wellicht).

Hopelijk kun je hier iets mee!

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]  
[5.1.2e]