

Factsheet Bron- en Contactonderzoek	
Kernboodschap	Op dit moment wordt door de GGD overal het klassieke bron- en contactopsporing (BCO) uitgevoerd. BCO is in samenhang met grootschalig testen belangrijk in de overgangsfase om de situatie goed te monitoren en opflakkingen van het virus snel de kop in te drukken. De GGD'en hebben de regionale capaciteit voor het BCO opgeschaald en werkt er nu hard aan om ook de landelijke capaciteit verder op te schalen, conform het opschalingsplan. Met dit opschalingsplan zijn de GGD'en gereed om de extra vraag naar BCO aan te kunnen.
Achtergrond	BCO De GGD voert BCO rond een bevestigde patiënt uit met als doel het identificeren en inlichten van contacten en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiëne, thuis blijven en laten testen bij klachten. De GGD identificeert drie categorieën contacten: 1. Huisgenoten: iedereen de woonomgeving deelt en langdurig contact had op minder dan 1,5m afstand. Advies: veertien dagen quarantaine. 2. overige nauwe contacten: iedereen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5m afstand contact had en kortdurende hoogrisicoblootstellingen. Dringend advies: veertien dagen thuis. 3. overige contacten: iedereen die langer dan 15 minuten contact had op meer dan 1,5m afstand. Advies: extra alert te zijn op klachten passend bij Covid-19. Deze adviezen worden zowel schriftelijk als mondeling toegelicht. Vervolgens bellen de GGD'en in het kader van nazorg de contacten op dag 1, 7 en 14 van de getroffen maatregelen. Hoogrisicogroepen kunnen vaker worden nagebeeld. <pre> graph TD A[Isolatie van de patiënt] --> B[Bron- en contactonderzoek] B --> C[Contact en instructies voor contacten] C --> D[Bij ziekteverschijnselen] </pre> 1 Isolatie van de patiënt 2 Bron- en contactonderzoek (binnen 24 uur na melding) met personen waar de patiënt contact mee heeft gehad en locatie/persoon waar de infectie vermoedelijk is opgelopen. 3 Contact en instructies voor contacten Delen van leefregels, vragen om alertheid en snel handelen bij ziekteverschijnselen. 4 Bij ziekteverschijnselen bij een van de contacten worden de stappen herhaald (het positief: isolatie > BCO > instructies). Op 20 mei (ten tijde van vorig Kamerdebat) is het bco protocol aangepast. De nazorg en het zowel schriftelijk als telefonisch informeren van huisgenoten en overige nauwe contacten zijn toegevoegd. Ook is aan de categorie 'overige nauwe contacten' de contacten met een kortdurende (<15 min) hoogrisicoblootstelling toegevoegd. Advies: veertien dagen thuis blijven. Het Nederlands protocol is in lijn met de internationale richtlijnen, met het onderscheid tussen huisgenoten en overige nauwe contacten is het Nederlands protocol zelfs strenger. De WHO adviseert geïdentificeerde contacten dagelijks na te bellen. De ECDC geeft bij de vertaling van de WHO-richtlijn ruimte voor landen om de monitoring anders in te richten. In Nederland worden contacten dus op dag 1, 7 en 14 gebeld. Opschaling GGD'en De GGD'en werken op dit moment hard aan de opschaling om het benodigd aantal BCO mogelijk te maken. Op dit moment is er regionaal 1100fte beschikbaar voor ongeveer 700 BCO per dag. Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van de landelijke capaciteit voor een flexibele schil zodat er 1500 BCO per dag kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat niet direct de maximale capaciteit ingezet hoeft te worden en dat de landelijke capaciteit snel beschikbaar is.
Overig	U heeft op 2 juni gesprek gehad met de GGD'en over de wenselijkheid van het

(zoals heikele punten en pers)	gebruiken van reserveringsgegevens van horecagelegenheden (en andere sectoren waar sprake is van reserveringen) voor het bco, op basis van expliciete toestemming van de klant. De GGD'en kunnen deze gegevens gebruiken. Op dit moment wordt in overleg met de betreffende sectoren bekeken hoe een dergelijke toestemmingsvereiste uitgevoerd kan worden waardoor reserveringsgegevens voor het bco ingezet kunnen worden door de GGD'en. U heeft verzocht om te bekijken hoe we om moeten gaan met vakantiegangers in het buitenland die met klachten terugkeren en met vakantiegangers die terugkeren uit een land dat vanwege een uitbraak een hoogrisico land wordt. Deze vragen staan op dit moment uit bij de GGD.
--------------------------------	--

Tijdspad BCO

Contactopsporing	Opvolgen	Handelingsperspectief	En
Voor 12 maart	Hoogrisicocontacten zonder symptomen ontvangen van de GGD een informatiebrief	Gezinsleden moeten hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze personen niet mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen. Zij mogen wel naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen Alert te zijn op luchtwegklachten. Eenmaal per dag hun temperatuur te meten en dagelijks hun gezondheidssituatie door te geven aan de controlerende instantie	Hygiëne, geen handen schudden
Vanaf 12 maart	Basis: de GGD stelt besmette persoon op de hoogte en vraagt hen contacten op de hoogte te stellen	De GGD voert contactonderzoek rond een bevestigde patiënt uit met als doel het inlichten van contacten, met name uit groepen met een verhoogde kans op ernstig beloop, en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiëne en thuis blijven bij klachten	Hygiëne, geen handen schudden Iedereen blijft thuis!
Vanaf 6 mei (verscherping vanaf nu)	Huisgenoten De GGD informeert huisgenoten (inclusief kinderen) mondeling en schriftelijk met het advies om:	Twee weken na het laatste contactmoment in quarantaine dus strikt thuisblijven; Alert op klachten Bij vermoeden van koorts temperaturen; GGD bellen bij koorts Bereikbaar te zijn voor de GGD tijdens deze quarantaineperiode. De GGD zorgt ervoor dat huisgenoten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen bij	Goede hoest- en handhygiëne

		COVID-19. De GGD heeft aan het eind van de quarantaineperiode contact met de huisgenoot en sluit de monitoring af.	
	Overige nauwe contacten (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5m afstand). GGD informeert overige nauwe contacten mondeling en schriftelijk met het advies om:	Twee weken na het laatste contactmoment thuisblijven (thuiswerken, geen ov, geen bezoek). Minimaal 1,5m afstand houden van andere mensen. Alert op klachten Bij vermoeden van koorts temperaturen; GGD bellen bij koorts. De GGD zorgt ervoor dat huisgenoten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen bij COVID-19. De GGD heeft aan het eind van de quarantaineperiode contact met het nauwe contact en sluit de monitoring af.	Goede hoest- en handhygiëne
	Overige contacten (meer dan 15 minuten op meer dan 1,5m afstand). GGD informeert overige contacten met het advies om:	Algemene maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen (social distancing). Alert op klachten Bij vermoeden van koorts temperaturen; GGD bellen bij koorts en dan thuis blijven. De GGD zorgt ervoor dat huisgenoten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen bij COVID-19.	Goede hoest- en handhygiëne