To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 10.2.e 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @minbuza.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 11/25/2020 1:00:56 PM
Subject: RE: EU aanpak quarantaineduur
Received: Wed 11/25/2020 1:00:57 PM

Uit de LCI richtlijn

Beleid bij asymptomatische infecties

Een index die bij het moment van testen geen klachten heeft blijft in ieder geval tot 72 uur na testafname in isolatie. Indien na 72 uur de index nog klachtenvrij is, mag de index uit isolatie
. Alle met moleculaire laboratoriumtechnieken **bevestigde COVID-19-patiënten** moeten in isolatie blijven tot de periode beschreven in onderstaande tabel.

COVID-19-patiënt	Beschrijving	Advies opheffen isolatie
In het ziekenhuis	Patiënten en zorgmedewerkers met COVID-19 in ziekenhuizen	Zie het advies van FMS-expertisegroep infectiepreventie
In overige instellingen, (verpleeghuis of gehandicaptenzorg)	Patiënt met bewezen COVID-19 niet opgenomen in ziekenhuis	Ten minste 24 uur symptoomvrij[2] EN 48 uur koortsvrij[1] EN minimaal 14 dagen na de start symptomen[3]
	Immuungecompromitteerde[4] patiënt met COVID-19 niet opgenomen in ziekenhuis	Ten minste 24 uur symptoomvrij[2] EN 48 uur koortsvrij[1] EN minimaal 14 dagen na de start symptomen[3]; overweeg 2 keer testen met 24 uur ertussen
Binnen en buiten instellingen	Zorgmedewerkers met COVID-19	Ten minste 24 uur symptoomvrij[2] EN 48 uur koortsvrij[1] EN minimaal 7 dagen na de start symptomen[3] (indien immuungecompromitteerd[4] zie hierboven)
Buiten instellingen	Patiënt met COVID-19 in thuissituatie	Ten minste 24 uur symptoomvrij[2] EN minimaal 7 dagen na de start symptomen[3]
	Immuungecompromitteerde patiënt	Ten minste 24 uur symptoomvrij[2] EN minimaal 14 dagen na de start symptomen[3]; overweeg 2 keer testen met 24 uur ertussen
Bijzondere situaties	Bij aanhoudende hoestklachten	Ten minste 24 uur sterk afgenomen hoestklachten EN 48 uur koortsvrij[1] EN minimaal 14 dagen na start symptomen[3]; overweeg eenmalig testen
	Bij op het moment van afname asymptomatische personen	Minimaal 72 uur na afname van monster[5]

1. *Koortsvrij*: temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie.
2. *Symptoomvrij* van COVID-19: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze

klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.
3. *Start symptomen:* ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.
4. *Immuungecompromitteerd:* een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-celaantal < 200/mm³, zie verder onder het hoofdstuk Risicogroepen het punt over 'verminderde weerstand' onder het kopje 'Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten'.
5. Om uit te sluiten dat patiënt in de presymptomatische fase verkeert. Indien patiënt in de presymptomatische fase verkeert, zal deze binnen 72 uur symptomen ontwikkelen.

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: woensdag 25 november 2020 13:48
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e . < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e . (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e 1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minbuza.nl>
Onderwerp: EU aanpak quarantaineduur

Hoi allen,

Zoals verwacht is de Europese Commissie vandaag gekomen met een aanbeveling voor een gemeenschappelijk Europees quarantainebeleid. Onderstaand de belangrijkste aanbevelingen, die op veel punten niet overeenkomen met NL beleid. Vrijdag is de eerste discussie in de HSC, het stuk zal uiteindelijk ook vastgesteld worden in de HSC.

@ 5.1.2e , ik zou graag iemand van het RIVM aanhaken op deze discussie, wie is hier de beste contact voor?

@Team quarantaine, ik zou voor de discussie aanstaande vrijdag graag scherp hebben wat precies ons beleid is tav bevestigde gevallen. Willen jullie mij dat laten weten?

Belangrijkste aanbevelingen uit het stuk:

Bevestigde gevallen

- Bij milde gevallen, minimaal 10 dagen isolatie, met herstel van koorts voor drie dagen en verbetering van andere klinische symptomen, of twee opvolgende negatieve tests met een interval van 24 uur
- Bij ernstige gevallen, minimaal 14 dagen en maximaal 20 dagen, met herstel van koorts voor drie dagen en verbetering van andere klinische symptomen, of twee opvolgende negatieve tests met een interval van 24 uur
- Bij asymptomatische gevallen 10 dagen na afname test

Contacten

- 10 dagen quarantaine na risicocontact, mogelijk verkorting met negatieve test na 7 dagen

Reizigers

- Om herintroductie van het virus te voorkomen, zouden landen of gebieden die een duurzame controle over SARS-CoV-2 hebben bereikt, kunnen overwegen om personen uit andere gebieden binnen hetzelfde land of uit een ander land (met hoog transmissieniveau) gericht te testen en op te volgen
- In het geval landen besluiten reisbeperkingen in te voeren, kan het testen van symptomatische reizigers, direct na hun terugkeer, een prioriteit zijn

Groet, 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
Programmadirectie COVID-19 / Directie Publieke Gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
T 5.1.2e