

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Fri 11/20/2020 9:13:13 AM
Subject: RE: WHO raadt gebruik redmdesivir af
Received: Fri 11/20/2020 9:13:14 AM

Dit lijkt me een vraag voor [redacted] *

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 09:46
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: FW: WHO raadt gebruik redmdesivir af

Beste [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],

Hebben wij hier een reactie op? Ik hoorde het vanochtend ook op het nieuws. Daarbij werd ook gezegd dat er nog onderzocht wordt of het voor specifieke doelgroepen misschien wel gebruikt kan worden.

Op onze site staat dat het een klinisch effect heeft bij opgenomen patiënten. (zie onder)

Groet, [redacted]

Vandaag op NOS.nl:

WHO raadt gebruik remdesivir bij coronapatiënten af

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt het gebruik van het antivirumiddel remdesivir af bij de behandeling van coronapatiënten in ziekenhuizen, hoe ziek de patiënt ook is. Een groep deskundigen [zegt](#) dat er "op basis van de huidige beschikbare gegevens" geen bewijs is dat het gebruik van remdesivir leidt tot positieve resultaten voor patiënten. Het advies volgt op vier internationale onderzoeken onder meer dan 7000 patiënten, die met het coronavirus in het ziekenhuizen lagen.

[Vorige maand](#) bleek al dat vier veelgebruikte antivirale middelen, waaronder remdesivir, niet werken tegen covid-19. Wel werd toen geopperd dat patiënten met een lager risico op een ernstig beloop van de ziekte wellicht meer aan het middel hebben dan patiënten met een hoog risico daarop.

Remdesivir is oorspronkelijk een medicijn tegen ebola, ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Gilead. Het is een kostbaar medicijn dat via een infuus moet worden toegediend. Het middel wordt ook in Nederland gebruikt. Gilead is het oneens met de WHO-richtlijn en zegt dat remdesivir in veel landen wordt erkend als behandelingsmethode voor mensen met covid-19.

In ons dossier De Ziekte:

Voor twee medicijnen is vastgesteld dat die klinisch effect hebben bij opgenomen patiënten met COVID-19:

- **Dexamethason** en andere corticosteroïden. Dit zijn middelen die de afweer onderdrukken. Het is aangetoond dat deze middelen de kans op overlijden verminderen bij opgenomen patiënten met COVID-19 die extra zuurstof nodig hebben. Deze middelen worden afgeraden voor mensen met milde klachten, die niet naar het ziekenhuis hoeven of extra zuurstof nodig hebben. Dan kan het medicijn de ziekte namelijk erger maken. Deze medicijnen worden al zeer

lang bij patiëntenzorg gebruikt, maar niet vaak bij infectieziekten.

- **Remdesivir**, een antiviraal middel. Dit middel wordt via een infuus toegediend. Het kan het klinisch herstel versnellen bij opgenomen patiënten met COVID-19 die extra zuurstof nodig hebben. Dit middel is in juli 2020 in Europa hiervoor geregistreerd.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 30 5.1.2e

M +31 6 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

5.1.2e