

## Advies BAO

### Aanwezig:

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (vz)  
 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e  
 (allen VWS)  
 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e (PDC19), 5.1.2e (SZW)  
 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e met 5.1.2e  
 (Veiligheidsregio's), 5.1.2e 5.1.2e (GGD), 5.1.2e  
 (OVV, als toehoorder)

**Afwezig:** VNG wegens vakantie

## Advies OMT

### Samenvattend:

- In quarantaine gaan en handhaving dat mensen dat doen zijn essentieel.
- Het OMT adviseert de quarantaineduur te bekorten tot 10 dagen na laatste potentiële blootstelling aan een COVID-19-indexgeval. Het risico dat in die laatste 4 dagen toch een besmetting blijkt weegt niet op tot de extra dagen quarantaine.
- Het OMT adviseert het testen van nauwe contacten zonder klachten op dag 6-7, alsmede ook een eerder testmoment (dag 3-4), te onderzoeken mits dit laatste uitvoerbaar is binnen de testcapaciteit. De BCO-richtlijn wordt op dit punt pas aangepast, nadat de effectiviteit hiervan uit het onderzoek blijkt.
- Deze adviezen gelden voor zowel nauwe contacten (categorie 1 en 2) in het BCO, voor gebruikers van de Coronamelder die een melding krijgen van een risicocontact, als voor terugkerende reizigers uit risicogebieden.
- Voor de laatste groep, welke een groot aantal personen kan inhouden, wordt geadviseerd dit eerst alleen voor dag 6-7 in onderzoeksetting te evalueren, mede als op dag van aankomst een test is afgenomen. Onderzoek voor dag 3-4 is dan beperkt tot nauwe contacten BCO en gebruikers van de corona app.
- Bij het bekorten van de quarantaine tot 10 dagen of na beëindiging van quarantaine op grond van een negatieve testuitslag op dag 6-7, blijft een hoge mate van alertheid gewenst tot 14 dagen na het laatste blootstellingsmoment; bij (milde) klachten moeten zij zich laten testen en thuisblijven in afwachting van de testuitslag. Immers, het nauwe contact kan alsnog besmet blijken.

### Technische vragen

Kan de quarantaineduur nog verder verkort worden?

- Ja dat kan maar daar moeten we voorzichtig mee zijn. Nu dus nog niet. Daar zijn ook de experimenten met testen op dag 5-7 en 3-4 voor bedoeld.

Wanneer gaat quarantaine in?

- Na laatste risicovolle contact en voor reizigers bij het passeren van de grens/ aankomst op Schiphol.

Is er voldoende testcapaciteit?

- Dat is afhankelijk van de inzet van testen bij mensen zonder symptomen. Als je je richt op de groepen met het grootste risico is de inzet relatief het laagst. Capaciteit wil je zo doelmatig mogelijk inzetten en als je iedereen zonder klachten test, ook buiten BCO neemt ook de kans op fout positieven toe. Wel wordt onderzocht of extra inzet testen van personen zonder klachten bij bijvoorbeeld een besmetting in een verpleeghuis zin heeft.

Wat zijn de consequenties van een negatieve test op dag 6-7?

- Nu nog geen, er moet eerst een uitkomst van het onderzoek zijn.

Zal het onderzoek van 5.1.2e voor interferentie zorgen?

- Die uitkomsten nemen we later mee.

### Overwegingen

Let op communicatie: heldere eenduidige boodschap is nodig, met het terugbrengen van de quarantaineperiode moet niet de indruk ontstaan dat het wel meevalt. In het OMT advies wordt gewezen naar kans dat een nauw contact besmet is. Moet niet zo zijn dat communicatie wordt opgepakt dat een kans van 3-7% heel klein is. Nadruk moet liggen op de kans is bij nauwe contacten vele malen groter dan voor een niet aan BCO gerelateerd asymptomatisch persoon. Moet in communicatie ook duidelijk zijn of er capaciteitsproblemen ontstaan n.a.v. aandachtspunten daarover in OMT advies.

De veiligheidsregio's vragen goede instrumenten en eenduidig omgaan met die instrumenten voor isolatie en quarantaine.

De BCO richtlijn wordt op basis van OMT/BAO advies en besluitvorming over dit advies van MVWS aangepast door RIVM op lengte quarantaine van 14 naar 10 dagen maar nog niet op het punt van testen. Hiervoor zijn de uitkomsten van de onderzoeksvragen van belang. Het onderzoeksprotocol moet ook naar de effecten op testcapaciteit kijken.

Testbereidheid van mensen en gedragseffecten

Betrek deze aspecten en bezie of en zo ja wat de effecten zijn.

Los van dit advies, wordt vastgesteld dat het goed is om het perspectief van werkgevers en werknemers ten aanzien van kansen en problemen door quarantaine en de bereidheid tot testen nader te bespreken. VWS en SZW praten hierover door.

**Advies BAO**

Het BAO onderschrijft het OMT advies volledig. Op een paar punten extra alert zijn, communicatie, precies in wat we gaan doen maar ook waarom we dat gaan doen. Kijk goed naar uitvoerbaarheid van de termijn van quarantaine, en het dwingend voorschrijven. Let op de relatie met de testcapaciteit, nu eerst via onderzoekssetting met een onderzoeksprotocol.